

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 10.01.2020/11549



FERBİS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

Net Miktarı:
Azami Per. Satış Fiyatı:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre	
Buğday Arpa	Kandamlası İtalyan siğirdilli Yabık boya kökü Taşkesen otu Sarı ot Rum yalancı keteni Yabani tere Boynuz otu Uzun süpürge otu Kıraç itiri Sarkık meyveli yavruağı Yabani çivit otu Trakya hardalı Yabani hardal Süpürge otu Kaba fiğ Adi fiğ	(<i>Adonis aestivalis</i>) (<i>Anchusa azurea</i>) (<i>Asperugo procumbens</i>) (<i>Buglossoides arvensis</i>) (<i>Boreava orientalis</i>) (<i>Camelina rumelica</i>) (<i>Cardaria draba</i>) (<i>Cerastium dichotomum</i>) (<i>Descurainia sophia</i>) (<i>Geranium stepporum</i>) (<i>Hypocoum pendulum</i>) (<i>Isatis tinctoria</i>) (<i>Neslia apiculata</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Sisymbrium altissimum</i>) (<i>Vicia narbonensis</i>) (<i>Vicia sativa</i>)	50 ml/da	14 gün
Buğday Arpa	Tarla papatyası Saka dikenli Tarla hazeranı Boynuzlu yoğurt otu Çoban değneği Tarla düğün çiçeği Meryem dikenli Parmaklı yavşan otu	(<i>Anthemis fumariifolia</i>) (<i>Carduus pycnocephalus</i>) (<i>Consolida regalis</i>) (<i>Galium tricorutum</i>) (<i>Polygonum bellardii</i>) (<i>Ranunculus arvensis</i>) (<i>Silybum marianum</i>) (<i>Veronica triphyllos</i>)	60 ml/da	14 gün
Buğday Arpa	Kekre Kokar ot Gökbaş Köygöçüren Doğu ballıbabası	(<i>Acroptilon repens</i>) (<i>Bifora radians</i>) (<i>Centaurea cyanus</i>) (<i>Cirsium arvense</i>) (<i>Wiedemannia orientalis</i>)	70 ml/da	14 gün
Mısır *	İmam pamuğu Kırmızı köklü tilki kuyruğu Uzun loğusa otu Sirken Yabık sirken Gökbaş Dil kanatan Gecese fası Adi soda otu Köpek üzümü Domuz pıtrağı	(<i>Abutilon theophrasti</i>) (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Aristolochia maurorum</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Chenopodium vulvaria</i>) (<i>Centaurea cyanus</i>) (<i>Galium aparine</i>) (<i>Ipomoea stolonifera</i>) (<i>Salsola kali</i>) (<i>Solanum nigrum</i>) (<i>Xanthium strumarium</i>)	70 ml/da	14 gün
Mısır *	Kekre Tarla sarmaşığı	(<i>Acroptilon repens</i>) (<i>Convolvulus arvensis</i>)	80 ml/da	14 gün

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

10 Kasım 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

Fnamec®

Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu | 0,4 | B,2 | Herbisit (Yabancı ot İlacı)

452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +
6,25 g/l Florasulam

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KEŞİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bulantı, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi ve uyuşukluk görülebilir. Deri ve gözde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.
Yutulması halinde Kusturmayın. Doktor çağırın ve/veya acil servise nakledin. Kusturup, kusturmama kararı doktor tarafından alınmalıdır.
Gözle temas etmesi halinde Hemen, su ile en az 5 dakika süreyle iyice yıkayınız.
Ciltle temas etmesi halinde Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanarak akan suyun altında veya duşa yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkartın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
Solunması halinde Temiz havaya çıkarn. Bir doktora danışın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Doktor yarısına göre destekleyici tedavi/bakım uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

© FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

İÇİNDEKİLER:
2,4-D Ethylhexyl ester
Florasulam

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



REV.1

H.T.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Fnamec® uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatin kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatin sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapılmamalıdır.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında

(7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C'nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Fnamec® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 + B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Fnamec®**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamızdır. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 + B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



FERBİS TARIM TİCARET
VE SANAYİ A.Ş.

Fnamec®

Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu	O,4	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----	-----------------------------

**452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +
6,25 g/l Florasulam**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sulanına bulandırmayınız.
- Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur.
- Uygulama sonrasında sıcak ve nemli şartlar ürünün etkisini artırıp hızlandırırken kurak şartlar etkiyi geciktirebilir.
- Uygulamadan 2 saat sonra yağın yağmur ürünün etkisini azaltmaz.
- Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için uygulamadan önce veya 2 saat sonra yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilir.
- Toprakta bakiye bırakmaz. Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsulere olumsuz bir etkisi yoktur.
- Boşalan ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız.

DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22

10 Kasım 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



REV.1

H.T.